

UTILIZZO DELLA CICLOSPORINA OFF LABEL NEL TRATTAMENTO DELL'ECZEMA NUMMULARE NON RESPONSIVO AD ALTRI TRATTAMENTI

Ferrucci S.¹, Brambati M.¹, Bottini S.¹, Pigatto P.²

¹Istituto di Scienze Dermatologiche, Università degli studi di Milano – Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano

² Dipartimento di Tecnologia per la Salute IRCCS Istituto Galeazzi Milano

L'eczema nummulare cronico recidivante viene trattato in prima linea con corticosteroidi topici e sistemici e con gli inibitori della calcineurina. Tuttavia, l'impiego cronico di queste terapie può indurre noti effetti collaterali e può determinare perdita di efficacia a causa dei fenomeni di tachifilassi. Presentiamo 5 pazienti atopici affetti da eczema nummulare trattati con ciclosporina 4mg/kg/die per un periodo di tempo massimo di 4 mesi. L'anamnesi familiare e personale era positiva per atopia e tutti i pazienti presentavano aumento delle IgE totali con test cutanei ed ematici positivi. Il trattamento con ciclosporina ha determinato un rapido miglioramento del quadro clinico con buon controllo delle manifestazioni cutanee e dei sintomi associati e lunghi periodi di remissione senza registrare effetti collaterali importanti. La ciclosporina a dosaggio terapeutico può essere considerata un'alternativa terapeutica nei pazienti affetti da eczema nummulare cronico non responsivo alle terapie convenzionali.