

10-12

SOCIETÀ ITALIANA  
DI CHIRURGIA D'URGENZA  
di Pronto Soccorso  
E DI TERAPIA INTENSIVA CHIRURGICA

# 1° CONGRESSO NAZIONALE



10-12 giugno 1973  
ASINO LIGURIA

ABSTRACTS

TITOLO UTILITA' DELLA NUTRIZIONE ENTRALE (NE) CON DIETE ELEMENTARI  
ASSOCIATA ALLA NUTRIZIONE PARENTERALE (NP)

SALLUSTI M., CRISTALLO M., ANDREONI B., STAUDACHER C., CHIESA R.

In numerosi pazienti chirurgici è stata utilizzata l'associazione della NE alla NP in quanto siamo convinti che, qualora il paziente debba essere sottoposto per tempi radiologici al digiuno, la NP totale possa essere causa di inconvenienti legati in parte alla via non fisiologica di somministrazione dei composti nutritivi, in parte alla completa messa a riposo del canale gastroenterico.

Sono stati utilizzati per la NE dei preparati dietetici in grado di superare le comuni difficoltà incontrate in questo tipo di alimentazione, che sono rappresentate da 1) incapacità dei prodotti tradizionalmente usati nel fornire tutti gli elementi nutrizionali in una composizione definita e bilanciata; 2) facilità all'instaurarsi di diarree osmotiche difficilmente controllabili. Le diete elementari definite rappresentano l'alimento ideale in associazione alla NP in quanto contengono tutti gli elementi necessari nelle giuste proporzioni, necessitano di superfici di assorbimento ridotte e, opportunamente diluite, non costituiscono un carico osmotico.

Si è ritenuto opportuno controllare il loro effetto trofico ricorrendo a periodiche biopsie epatiche eseguite per via extraperitoneale posteriore e a biopsie ileali utilizzando la stessa sonda digiunostomica formata da un tubo di Nelaton N° 14 a punta mozzata attraverso il quale è stato agevole introdurre le comuni pinze biotiche di un endoscopio. La regressione dello stato steatosico epatico e la rigenerazione delle strutture villose ileali, effetti tipici dell'NP totale, permette di concludere che un apporto enterale, seppur con diete particolari, è di notevole utilità per il trofismo viscerale ed è estensibile anche a situazioni patologiche che abitualmente escludono una via nutrizionale enterale.