

## **Le foreste urbane ai tempi del COVID-19 ci proteggono dalle polveri sottili**

S. Fares, G. Sanesi, G. Vacchiano, F. Salbitano, M. Marchetti.

Gruppi di lavoro SISEF Inquinamento e foreste e Verde urbano.

### ***Possibili legami tra particolato ed infezione da SARS-CoV2***

I processi di deforestazione, urbanizzazione e frammentazione ecologica e del paesaggio, con le dovute differenze che esistono nelle diverse zone del pianeta, sono riconosciuti come predisponenti e ora determinanti nella trasmissione e fors'anche nella diffusione delle zoonosi. Ma che l'aria delle città non sia particolarmente buona non è una scoperta recente. A partire da venerdì 26 novembre 1948 quando una densissima nebbia iniziò ad avvolgere Londra e avvolse la città per 6 giorni (Samet, 2016), vi è una ampia letteratura scientifica sull'inquinamento nelle aree urbane e sulle problematiche che le diverse componenti inquinanti determinano per la salute e la qualità della vita dei cittadini. Fra questi, le polveri sottili sono fra le componenti maggiormente sotto attenzione nel indagare cause predisponenti e fattori di facilitazione della diffusione pandemica del virus SARS-Cov2.

Uno degli effetti indiretti dei provvedimenti di contenimento del SARS-CoV2 è stato quello di limitare il traffico veicolare e molte attività produttive, principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici come ossidi azoto, ozono e polveri sottili. Sulla base delle osservazioni finora registrate, sembra possa esserci una correlazione tra la diffusione e la letalità dell'infezione da SARS-CoV2 e il livello di inquinamento atmosferico cronico o acuto, anche tenendo conto di altri fattori confondenti (Xiao Wu, 2020), e associazioni tra inquinamento e aumentato rischio di malattie infettive sono già state evidenziate (Su, 2019). In effetti, aree come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, dove il virus ha presentato la maggiore diffusione, fanno registrare generalmente le maggiori concentrazioni degli inquinanti atmosferici misurati e controllati secondo quanto indicato e prescritto dalla legislazione di settore (DLgs 155/2010). E' ben noto che l'esposizione ad inquinamento atmosferico ed in particolare alle polveri sottili, l'ozono e gli ossidi di azoto (NOx) favorisce malattie che coinvolgono l'apparato respiratorio e comunque determinano un peggioramento dello stato di salute, pur con numeri che sono difficilmente calcolabili. L' Organizzazione Mondiale della Sanità (WMO) riporta 7 milioni di morti premature all'anno (550.000 morti premature in Europa), numeri ben superiori ai decessi causati direttamente dal COVID-19. L'Agenzia Ambientale Europea (EEA) ogni anno produce un report sul rischio di decesso a causa dell'inquinamento basandosi su una fitta rete di centraline di monitoraggio dell'aria presenti nei diversi paesi, stimando per l'Italia nel report circa 60.000 morti premature per esposizione a PM2,5. Questo infatti, subito dopo dieta, fumo, ipertensione e diabete pare essere un fattore di rischio tra i più importanti, e si stima causi ogni anno 2.9 milioni di morti premature in tutto il mondo (<https://www.stateofglobalair.org/report>). Nel nostro paese, l'ipotesi di un possibile

collegamento tra la diffusione del COVID-19 e l'inquinamento atmosferico deriva dall'alta concentrazione di COVID-19 nella pianura padana riconosciuta come una delle aree geografiche più inquinate d'Europa (Re, 2020; Conticini 2020). Un recente studio effettuato da ricercatori dell'Università di Bari, Bologna e Trieste, e dell'ateneo di Napoli "Federico II" ha anche riscontrato la presenza di materiale genetico del SARS-CoV-2 sul particolato atmosferico campionato in aree particolarmente affette dalla diffusione del virus nel nord Italia. Futuri studi dovranno stabilire se il particolato può essere vettore del virus nella sua forma attiva e se la traccia del virus riscontrata sulle particelle rappresenta una dose di inoculo sufficiente ad infettare.

### ***Come possono aiutarci le nostre foreste urbane?***

Mentre ci si chiede in che maniera il particolato atmosferico possa essere associato alla diffusione e all'impatto del COVID -19, non possiamo che rilevare con certezza che vivere in aree urbane dove l'inquinamento atmosferico è elevato incide sullo stato di salute generale della popolazione, come rilevato da Soggiu e Settimo in un comunicato dall'Istituto Superiore di Sanità. Protagonisti nella lotta alla riduzione del particolato diventano gli alberi, i boschi e tutta la vegetazione urbana, in grado di rimuovere una certa quantità di particolato atmosferico. In che modo? La frazione più grossolana del particolato (PM10) si deposita sulla superficie delle foglie, intrappolata su cuticole, cere e peli di cui molte foglie sono costituite, disperdendosi periodicamente con la pioggia e finendo per la maggior parte nel terreno o nell'acqua superficiale. La frazione più fine (PM 2.5) può anche essere immagazzinata e successivamente degradata dalle foglie attraverso vie che coinvolgono gli stomi. Gli studi più recenti hanno messo in luce che la rimozione di particolato è direttamente proporzionale alla quantità di biomassa fogliare, pelosità e contenuto di cere. Inoltre condizioni meteorologiche favorevoli (precipitazione, radiazione solare, umidità, velocità del vento, temperatura e turbolenza) influenzano notevolmente la velocità di deposizione e quindi la capacità delle piante di migliorare la qualità dell'aria (Xing e Brimblecombe, 2019). Recenti campagne sperimentali all'interno di foreste periurbane presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Roma) e presso la riserva naturale di Bosco Fontana (Mantova) hanno consentito di misurare direttamente la deposizione di particolato grossolano e ultrafine, mettendo in risalto il ruolo di serbatoi di polveri sottili esercitato da questi preziosi ecosistemi forestali (Fares et al. 2016; Chiesa et al. 2019).

Come è stato dimostrato, tracce del COVID-19 sono state riscontrate sul particolato atmosferico, ma anche nelle acque di fogna. Perché non utilizzare le foglie degli alberi su cui le polveri sottili si depositano come filtri naturali e quindi sentinelle di possibili focolai di infezione?

### ***Quali sono le specie forestali che ci aiutano a sequestrare una maggiore quantità di particolato?***

Tra i diversi tipi di foresta urbana le differenze nella funzionalità di questo servizio ecosistemico sono legate soprattutto alla specie: le conifere possiedono una maggiore

capacità di raccolta di polveri sottili rispetto alle foreste di latifoglie (Xu et al. 2020), grazie alle proprietà di questi alberi di possedere aghi fini e densamente distribuiti. Tra le latifoglie, Yang e colleghi (2015) hanno sviluppato un metodo di classificazione per valutare una scala di idoneità alla rimozione del particolato fine delle specie di alberi più comuni in città. Fra le latifoglie, è stata sottolineata in particolare l'efficacia di gledizia (*Gleditsia triacanthos*), aceri (*Acer spp.*), platano (*Platanus x acerifolia*), tiglio (in particolare di *Tilia cordata*) e betulla (*Betula pendula*). E' quindi opportuno, dove l'obiettivo sia di massimizzare il sequestro di particolato, andare ad identificare una miscela di specie di conifere e latifoglie ad elevata efficienza di rimozione di particolato al contempo ecologicamente coerenti, in grado di adattarsi alle caratteristiche climatiche degli ambienti urbani. Sono in corso studi (Sgrigna et al., 2020) per definire strumenti più efficaci di scelta delle specie di alberi più idonee in programmi di selvicoltura urbana sulla base della loro propensione specifica a rimuovere particolato di varie dimensioni, in diverse stagioni e in base a diverse morfologie fogliari e di architettura delle chiome.

Sono pochi gli studi, soprattutto sul nostro territorio, che hanno avuto l'obiettivo di quantificare in che percentuale i boschi urbani riescono a rimuovere il particolato. In uno studio su Firenze, Bottalico et al. (2015) hanno evidenziato il contributo potenziale delle foreste urbane del capoluogo toscano nel rimuovere PM10. Nel caso specifico di Firenze, le foreste urbane - senza considerare gli alberi lungo i viali o quelli isolati o in piccoli gruppi in piazze, giardini oppure ambiti privati - possono contribuire a rimuovere fino al 15% del particolato presente in atmosfera. Recenti risultati su studi ancora in corso che coinvolgono i parchi urbani del Valentino (Torino) e di Castel di Guido (Roma), hanno dimostrato che un parco di circa 2 ettari annualmente riesce a rimuovere l'equivalente emissivo di almeno 176 autovetture euro 6. Se consideriamo il parco macchine che circola nelle nostre città, anche in previsione di una aumentata circolazione di autoveicoli dovuta alla scelta dei cittadini di limitare l'uso dei mezzi pubblici per non rischiare di esporsi al contagio, questi numeri possono sembrare esigui, ma se si valuta l'estensione del verde urbano e l'opportunità di aumentare la copertura forestale di ambiente urbano (oltre al Decreto Clima ci sono numerose altre iniziative in proposito, quali [www.60milionidialberi.org](http://www.60milionidialberi.org)), l'azione dei boschi urbani sulla rimozione di particolato acquisisce notevole rilevanza. Come osservato da Baro e colleghi (2014), le foreste urbane abbattano il particolato di pochi punti percentuali se si confronta il livello di background con la quantità di particolato effettivamente rimosso dalle foglie, tuttavia dobbiamo considerare che i parchi urbani riescono a veicolare la dispersione del particolato lungo strade e margini dei parchi. L'effetto di dispersione del particolato alcuni giorni fa è stato trattato da Barwise e Kumar (2020), che hanno messo in luce come una sapiente distribuzione del verde (ad esempio prevedendo una barriera verde alta almeno due metri composta da specie arboree ed arbustive piantate ad elevata densità) riesce a creare ambienti a ridotta concentrazione di inquinanti a beneficio dei cittadini che vi transitano. Occorre dunque una adeguata progettazione ad opera di esperti di diverse discipline, come dimostrano recenti esperienze di ricerca, dalla COST Action Greeninurbs (<http://www.greeninurbs.com/>) al recente progetto PRIN EUFORICC finanziato dal MIUR focalizzato sullo studio dei servizi ecosistemici forniti dal verde urbano.

Abbiamo focalizzato l'attenzione sul tema delle relazioni dirette fra la presenza di alberi, boschi e spazi verdi in città e l'incidenza del particolato per mettere in luce come città più verdi possano essere più efficaci nel diminuire la causalità e la vulnerabilità di diffusione epidemica. Non dimentichiamo però che foreste e alberi urbani hanno avuto e possono avere un ruolo

importante nella gestione, non solo in fase preventiva ma anche in modalità di supporto terapeutico. La disponibilità e la possibilità di esposizione al verde ha un significato importante nella mitigazione di ansia e stress derivati dalla paura del contagio e dall'isolamento. Ha inoltre un ruolo fondamentale nell'assicurare la possibilità di praticare attività fisica più o meno informale in ambienti con migliore qualità dell'aria. Non è quindi casuale che l'importanza delle foreste urbane e di altri spazi verdi sia ulteriormente cresciuta nelle cronache durante l'attuale pandemia: la possibilità di frequentare liberamente parchi e aree verdi in città è diventata un'icona della libertà negata dalle misure di distanziamento sociale e di quarantena.

Concludiamo con una raccomandazione: il patrimonio di verde urbano italiano può e deve essere ampliato non solo per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria, ma anche per un miglioramento della più ampia qualità della vita urbana. Realizzare e mantenere foreste urbane costa relativamente poco e potrebbe attivare una filiera di green jobs efficace anche in grado di riassorbire nel contesto lavorativo parte dei disoccupati determinata dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

## Riferimenti bibliografici

- Baró F, Chaparro L, Gómez-Baggethun E, Langemeyer J, Nowak DJ, Terradas J (2014). Contribution of Ecosystem Services to Air Quality and Climate Change Mitigation Policies: The Case of Urban Forests in Barcelona, Spain. *AMBIO*. 43: 466–479. - doi: 10.1007/s13280-014-0507-x
- Barwise Y, Kumar P (2020). Designing vegetation barriers for urban air pollution abatement: a practical review for appropriate plant species selection. *Npj Climate and Atmospheric Science*. 3: 1–19. - doi: 10.1038/s41612-020-0115-3
- Bottalico, F., Chirici, G., Giannetti, F., De Marco, A., Nocentini, S., Paoletti, E., Salbitano, F., Sanesi, G., Serenelli, C. Travaglini, D., 2016. Air pollution removal by green infrastructures and urban forests in the city of Florence. *Agriculture and Agricultural Science Procedia* 8 ( 2016 ) 243 – 251. doi: 10.1016/j.aaspro.2016.02.099
- Chiesa M, Bignotti L., Finco A., Marzuoli R., Gerosa G. 2019. Size-resolved aerosol fluxes above a broadleaved deciduous forest. *Agr. For. Met.* <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.107757>
- Conticini E., Frediani B., Caro D. 2020. Can atmospheric pollution be considered a co-factor in extremely high level of SARS-CoV-2 lethality in Northern Italy? *Environmental pollution*. doi: 10.1016/j.envpol.2020.114465
- Sgrigna, G., Baldacchini, C., Dreveck, S., Cheng, Z., Calfapietra, C. 2020. Relationships between air particulate matter capture efficiency and leaf traits in twelve tree species from an Italian urban-industrial environment. *Science of The Total Environment* 718:137310. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137310

- Xiao Wu MS, Nethery R.C., Benjamin Sabath M., Braun D., Dominici F. 2020. Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. <https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm>
- Xing Y, Brimblecombe P (2019). Role of vegetation in deposition and dispersion of air pollution in urban parks. *Atmospheric Environment*. 201: 73–83. - doi: 10.1016/j.atmosenv.2018.12.027
- Xu X, Xia J, Gao Y, Zheng W (2020). Additional focus on particulate matter wash-off events from leaves is required: A review of studies of urban plants used to reduce airborne particulate matter pollution. *Urban Forestry and Urban Greening*. 48: 126559. - doi: 10.1016/j.ufug.2019.126559
- Yang J, Chang Y, Yan P (2015). Ranking the suitability of common urban tree species for controlling PM2.5 pollution. *Atmospheric Pollution Research*. 6: 267–277. - doi: 10.5094/APR.2015.031

**Link utili citati nel testo:**

- <https://www.scienzainrete.it/articolo/inquinamento-atmosferico-e-coronavirus-chi-cerca-trova%C2%A0/simona-re-angelo-facchini-nataschia>
- [http://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset\\_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5355820?fbclid=IwAR2Ev-UC-elmNbymToVZXTX30864KujJIFTFbsT1LNc21CChVVQMV4zVOeo](http://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5355820?fbclid=IwAR2Ev-UC-elmNbymToVZXTX30864KujJIFTFbsT1LNc21CChVVQMV4zVOeo)
- <https://www.scienzainrete.it/articolo/inquinamento-atmosferico-e-covid-19/rete-italiana-ambiente-e-salute/2020-04-13>
- <https://www.agi.it/cronaca/news/2020-04-24/inquinamento-particolato-coronavirus-sima-8427205/?fbclid=IwAR3otW5xSz4JwLOnoBIUHMM3tB82Dknq0HttJtINdgMneZAwIOt3xSbXzXg>