# FOGLIO 043 MEZZOLOMBARDO

## DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

*UNITA' NON DISTINTE DYBASE AL BACINO DI APPARTENENZA*

**SINTEMA POSTGLACIALE ALPINO**

Ghiaie, sabbie, limi a stratificazioni orizzontale o inclinata (depositi alluvionali), Limi, argille, torbe, talora con intercalazioni sabbiose, a stratificazione orizzontale (depositi palustri e lacustri). Diamicton a supporto di matrice, massivi o con orizzontazioni di ghiaie e sabbie mal selezionate (depositi di detrito-falda e di conoide misti, ossia da debris flows o eventici e/o di versanti). Ghiaiotti e ghiaie eterometriche, clastosi a supporto di clasti e/o di matrice assumali gravitativi). Ghiaie con elementi angolosi di provenienza locale (depositi di versante), a luoghi di ampi dimensioni (depositi di versante a grossi blocchi). Depositi calcarei, Travertino, Depositi antropici, Cementazione discontinua o assente, Limite superiore coincidente con la superficie topografica, Spessore massimo di oltre 100 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P. – OLOCENE*

**SINTEMA DEL GARDA**

Diamicton massivi a supporto di matrice limoso-sabbiosa, scarsamente/molto (**fl** d'alluvgamento), Diamicton massivi a supporto di clasti e/o di matrice (**fl** d'alluvione e **fl** trattenente(s)), Diamicton, sabbie, ghiaie, talora stratificate, a fini da massivi a laminati (depositi di contatto glaciale e glaciolacustri), Ghiaie massive o grossolanamente stratificate, con intercalazioni sabbiose (depositi fluvioglaciali), Cementazione generalmente assente, Limite inferiore erosivo; limite superiore coincidente con la superficie topografica o incontorne con SG3$_1$, SG3$_2$, SG3$_3$, FTS, Spessore massimo di oltre 80 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

*GRUPPO DI FORTE CASARA*

Ghiaie e brecce clinostratificate e strutture da aperte a parzialmente aperte con clasti da eugilizi a subangolari (depositi di versante e di cgrne misto), Cementazione variabile da blanda a pervasiva, Presenza di fratture carsiformi e clasti alterati dell'interno, Limite inferiore con il substrato roccioso o con SG3, limite superiore incontorne con SG3, SG3$_1$ o FTS con morfologie erose verso valle, Interdigitamento e talora verso monte, Spessore fin oltre 100 m. *PLEISTOCENE INF. - PLEISTOCENE SUP. P.P.*

*SOTTOGRUPPO DEL T. NOCE*

**Subsintema di Medòro**

Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbiose-massive o con grossolana stratificazione orizzontale o inoncata (depositi fluvioglaciali e alluvionali), Alternanze di sabbie laminate e limi con lenti di ghiaia, ghiaie sabbiose e diamicton a supporto di matrice sabbosa deformate e ripiegati (depositi di contatto glaciale), Argille e limi (depositi lacustri), Ghiaie a struttura aperta o a supporto di clasti subangolari (depositi fl orgine mista e di debris-flow), Ghiaie eteromietriche con massi (depositi di frana), Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o incontorne con RSR, limite superiore incontorne con FTS, Spessore massimo il quasi 100 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

**Subsintema di Malè**

Diamicton massivi a supporto di matrice limoso-sabbiosa, scarsamente/molto (**fl** d'alluvgamento), Diamicton massivi a supporto di clasti e/o di matrice (**fl** d'alzione e **fl** trattenente(s)), Sabbie e sabbie limose scarsamente/molto alternate ad argille laminate (depositi glaciolacustri), Ghiaie massive o grossolanamente stratificate alternate a sabbie a stratificazione incrociata (depositi fluvioglaciali), Diamictomassivi, a supporto di matrice sabbioso-limosa, sabbie, talora a stratificazione incrociata, alternate a livelli (indistinti) presenza di deformazioni da gleciotettonica (depositi di contatto glaciale), Cementazione discontinua o assente, Limite inferiore erosivo con RSR o SG3; limite superiore incontorne con FTS, Spessore massimo il quasi 100 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

**Subsintema di Cles**

Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie da massive a grossolanamente stratificate (depositi fluvioglaciali e/o alluvionali), Ghiaie clinostratificate, sabbie e limi laminati (depositi di contatto glaciale) Diamicton massivi, ghiaie a struttura aperta o a supporto di clasti subangolari prevalentemente carbonatici (depositi di origine mista e di debris-flow), Cementazione blanda o assente, Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o incontorne con SG2 o RSR; limite superiore incontorne con SG3$_3$ o FTS, Spessore massimo di oltre 40 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

**SINTEMA DEL RIO BARNES**

Ghiaie, ghiaie sabbiose da massive a ben stratificate con subordinate intercalazioni sabbiose (depositi fluvioglaciali e/o alluvionali), Ghiaie clinostratificate, sabbie e limi laminati (depositi di contatto glaciale glaciolacustri) con presenza locale di ghiaie a struttura aperta o a supporto di clasti subangolari (depositi di debris-flow), Cementazione variabile da discontinua a pervasiva, Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o incontorne con RF3, limite superiore incontorne con SG3, SG3$_1$ o SG3$_2$, Spessore di oltre 100 m. *PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUP. P.P.*

**SINTEMA DEL RIO PESCARA**

Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbiose massive a grossolanamente stratificate (depositi alluvionali), Cementazione lassave e pervasiva, Limite inferiore non affiorante; limite superiore incontorne con RF5, Spessore massimo di oltre 15 m. *PLEISTOCENE INF. – PLEISTOCENE MEDIO*

*BACINO DELL'E. ADIGE E SOTTOBACINO DEL T. AVISIO*

**Subsintema di San Pedàs**

Ghiaie grossolanamente stratificate ed embriciate, con clasti arrotondati prevalentemente metamorfici (depositi fluvioglaciali), Ghiaie sabbiose, diamicton massivi a spiccata stratificazione (depositi di contatto glaciale), Sabbie e limi con indizi glaciali, a stratificazione orizzontale o clinostratificata, talora con pieghe e varia scala e faglie (depositi glaciolacustri), Diamicton a supporto di matrice, massivi (**fl** d'alzione), Diamicton a supporto di matrice e di clasti, ghiaie grossolanamente stratificate o diamicton a clasti subangolari prevalentemente di provenienza locale (depositi di origini miste), Limite inferiore con CLD o con SG2 indistinto; limite superiore coincidente con la superficie topografica o incontorne con FTS, Spessore massimo di circa 100 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

**Subsintema di Lisignago**

Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie da massive a grossolanamente stratificate (depositi fluvioglaciali e/o alluvionali), Ghiaie, ghiaie sabbiose e sabbie stratificate, limi laminati, diamicton massivi a supporto di matrice e di clasti (depositi di contatto glaciale), Ghiaie massive o grossolanamente stratificate, diamicton a supporto di matrice (depositi di origine mista e di debris-flow), Diamicton massivi a supporto di clasti ed di matrice, (**fl** d'alzione e **fl** trattenente(s)), Blocchi e ghiaie eterometriche (depositi di frana), Limite non affiorante; angolare di provenienza locale (depositi di versante), Cementazione assente a assente, Limite inferiore con SG2 o SG1; limite superiore incontorne con FTS, Spessore massimo circa 100 m. *PLEISTOCENE SUP. P.P.*

**SINTEMA DE CALDARO**

Ghiaie, ghiaie e sabbie, grossolanamente stratificate, con clasti di sabbie a stratificazione incrociata concave, sovrincombibile e raramente orientate (depositi alluvionali e fluvioglaciali), Ghiaie e brecce clinostratificate, fondamente massive, a tessitura da particolarmente aperte ad aperte, con elementi eterometrici di provenienza locale (depositi di versante, anche a grossi blocchi), Diamicton a supporto clastico, fondamente di matrice, a clasti di provenienza locale (depositi di origine mista), Cementazione da assente a pervasiva, Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso; on NON o sagnito, limite superiore incontorne con SG3, SG3$_1$, SG3$_2$ o con FTS, Spessore massimo di oltre 200 m. *PLEISTOCENE MEDIO (?) – PLEISTOCENE MEDIO*

**SINTEMA DI PENONE**

Ghiaie eteromietriche, talora con massi, in genere a supporto clastico; breccie variamentecementate, massive o grossolanamente stratificate (depositi di origine mista), Diamicton massivi a supporto di matrice cementati (**fl** d'alluvione), Depositi comunemente sovrincombibili, Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o sepolto, limite superiore erosivo con CLD, Spessore massimo di circa 70 m. *PLEISTOCENE MEDIO (?) - PLEISTOCENE SUP.*

**SUBSINTEMA DI NOGARÈ**

Ghiaie a stratificazione orizzontale o inoncata con clasti da ben arrotondati a subarrotondati, con intercalazioni di sabbie (depositi alluvionali), Ghiaie e brecce a struttura aperta o a supporto di clasti subangolari (depositi di debris-flow), Cementazione da discontinua a pervasiva; alterazione da lieve a molto spinta, Limite inferiore erosivo, limite superiore incontorne con SG3, SG3$_1$ o FTS. Spessore di oltre 50 m. *PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUPERIORE P.P.*

**FORMAZIONE DE FAEDO**

Breccie stratificate a supporto di clasti di sabbi e dolomie, con matrice e livelli intercalcari sabbioso-siltose rossastre (depositi di debris-flow) Limite inferiore erosivo con il substrato roccioso o sepolto, limite superiore incontorne con SG3 o FTS, Spessore di oltre 40 m. *PLEISTOCENE INF. (?) – PLEISTOCENE MEDIO*

## SUCCESSIONE SEDIMENTARIA PERMO - CENOZOICA

**FORMAZIONE DE PONTE PÌA**

Calcari micritici laminati, sabbie, grigi chiari con intercalazioni di marne azzurrognoli e prevalenti marne nella parte superiore, Limite inferiore graduale su VAL o VAL$_1$ o SAA, Spessore: 70 m. *EOCENE MEDIO - SUP.*

**FORMAZIONE DEVAL D'AGOLA**

Successione in prevalenza terrigena divisa in tre membri dei quali nel Foglio affiorano i due superiori, La formazione è eteropica con SAA e???,

**Membro nell'Area di Campiglio**

Marne calcaree grigie e nere con sottili intercalazioni di calcari micritici scuri a cui s'alternano torbiditi carbonatiche con marcata frazione terrigena a quarzo e biotite, Limite inferiore graduale su SAA, Spessore: 0÷20 m. *EOCENE MEDIO*

**Membro delle Coste nel Grual**

Calcari micritici rossi (con subordinate intercalazioni di marne) in facies di Scaglia Rossa a "Globotruncana" ben stratificati (5÷30 cm), Limite inferiore graduale su SAA, Spessore: 0÷40 m. *CAMPANIANO - MAASTRICHTIANO*

**SCAGLIA ROSSA**

Calcari micritici laminiformi (5÷15 cm) rossi, selciferi nella parte inferiore, con intercalati marnosi e marne, a frammenti planctonici e talora scarsamente, **fl** feto unità glaurmentica biglietta (?sezione «westcritica» Auct.) (localmente con hardground colcite, Limite inferiore graduale o discordante su VAA, Spessore: 70-200 m. *CRETACICO SUP. - ?PALEOCENE*

**SCAGLIA VARIEGATA ALPINA**

Calcari micritici e calcari marnosi grigi scuri, rossi e biancastri a radiolari e foraminifer, di solito bioturbati con tipiche "flamme" grigiastre, ben stratificati (5÷15 cm), talora selciferi, Marne scuri, talora bituminose frgliettate, Limite inferiore transizionale rapido su MAE e incontorne su AVV, Spessore: 2÷70 m. *APTIANO – CENOMANIANO*

**MAIOLICA**

Calcari micritici ben stratificati a pareti frissisime generalmente rossi e biancastri alla base, Limite inferiore graduale rapido su AVV, Spessore:0÷20 m. *TITONIANO SUP. – BARREMIANO SUPERIORE*

## Giurassico

**ROSSO AMMONITICO VERONESE**

La Formazione è costituita da tre intervalli con distinti caratteristicamente, Alla base calcari micritici a fenestrerecti pelagici (tipo Biancone) e prodghiaiginitici, mal stratificati e a struttura nodulare di colore generalmente bianco, rosato e verdastro spesso completamente dolomitizzati, Nella parte intermedi, non sempre rappresentata, calcari nodulari ben stratificati con tre intercalazioni di sabbi rosse in lenti e livelli cineritici, Nella parte superiore calcari nodulari rossi ad Ammoniti, Limite inferiore netto, paraconcordante su DPR, RTZ ed RTL Spessore: 0-60 m. *BAJOCIANO SUP. – TITONIANO INF.*

**ENCRINITE DEL PELLER**

Calcari grigiastri a crinoidi, in strati spessi e a stratificazione incrociata che passano localmente ed eccinti pure di colline gialliastre e rossastre, Limite inferiore netto su RTZ$_3$, Spessore: 0-40 m. *TOARCIANO – BAJOCIANO INF.*

*GRUPPO DEI CALCARI GRIGI*

Comprende quatro formazioni di piattaforma carbonatica, tre delle quali presenti nell'area del Foglio,

**FORMAZIONE DI ROTZO**

Calcari biodetritici da grigio chiaro a bruno organizzati in sequenze di spessore da metrico a decametrico, La parte superiore è caratterizzata da tipici banchi bene/ben/molto gregari (Lithiotis, Cladocoropsis, Litiotzzina e Gervillia/ostrea), Limite inferiore netto su LDF erosivamente su RIG, Spessore: 80÷200 m. *SINEMURIANO – PLIENSBACHIANO*

**Membro di Torrèl**

Calcari oolitici e calcitici bioclastici in strati corretti con spugne e coralli, Limite inferiore graduale rapido su RTZ,Spessore: 150÷170 m. *SINEMURIANO – PLIENSBACHIANO*

**CALCARE OOLITICO DI LOPPIO**

Calcari oolitico-intraclastici grossolani di colorazione biancastra o grigio-chiara con rare laminazioni inonoste in strati da medi a spessi,Limite inferiore netto su RIZ, Spessore: 3b - 40 m. *SINEMURIANO P.P.*

**FORMAZIONE DI MONTE ZUGNA**

Calcari grigi chiari fino a biancastri prevalentemente micritici bioturbati con intercalazioni di pelti rossastre e verdi alla base, che passano a calcari micritici nodulari e a calcari micritici con noduli e liste di selce nella parte superiore,Limite inferiore netto su ZUG, gradualle sfumato in presenza di facie dolomitizzate su DPR, netto su paleosuoli DPR, Spessore: 100÷260 m. *RETICO SUP. – SINEMURIANO P.P.*

**CALCARE DI ZU**

Comprende tre membri dei quali due, uno di ampia estensione ed uno superiore di ambiente peritidale affiorano nell'area del Foglio a cavallo della Linea Trento-Cles,

**Membro di Tremalzo**

Calcari micritici e calcari dolomitici grigiscuri, bioturbati, con megalodontidi, calcari stromatolitici grigiverdastri con strutture da essiccamento e crostoni stromatolitici, Strati macroscopici, Limite inferiore graduale su ZUG$_3$, Spessore: 120 m. *RETICO*

**Membro dei Grostè**

Calcari micritici grigiscuri, marne e argilliti nere, bioclastcalcareniti gradate a molluschi e brachiopodi a strati medio-sottili, Localmente cespi di corallì, Limite inferiore netto concordante su DPR, Spessore: 40-60 m. *NORICO? – RETICO*

**DOLOMIA PRINCIPALE**

Dolomia grigiastra a grigio - bruna, localmente fetida alla percussione, in strati decimetrici laggermente ondulati con interstrati millimetrici marnosi di colore grigiastro alla base, La porzione media appare è dominata da cicli ossitidi da dolomia biancastra nette in alpra a livelli e laminazioni stromatolitiche,Limite inferiore netto su TVZ, discontinuo su SGL Spessore: 300÷400 m, fino a 1000 m nell'angolo nord occidentale, ed ovest della Linea Trento-Cles, dove non affiora la base. *CARNICO SUP. – RETICO P.*

**FORMAZIONE DI TRAVENANZES (ex Fm. di Raibl)**

Dolomie stratificate grigio-chiare e grigiastre in strati decimetrici separate da sottili intercalazioni di marne verdastre, Alla base sono talora visibili conglomerati e marnoe dolomitiche ed elementi embriciati prevalentemente calcarei, più raramente quarzosi, Limite inferiore netto su VVI, (osservato solo in gallerie), VAS e SCL,Spessore: 90 m. *CARNICO SUP.*

**VULCANITI BASALTICHE**

Lave andesitiche/basaltiche, in alcuni casi alterate e spesso fratturate di colore nerverdastro; sono presenti in corpi di limitata estensione con spessori di alcune decine di metri fino a massimo 150 m, affiorano a tetto di SCL sotto forma di corpi stratoidi entro CTR e come sandi filoni diretti in WSE, Limite inferiore discordante su SCL, Spessore: 0÷150 m. *LADINICO SUP.*

**CALCARE DELLA VAL VELA**

Calcari grigio chiaro, nocciola, grigiastri filamente laminati in strati decimetrici separati da sottili intercalazioni di argille grigio scuro/nere che diventano più frequenti nella parte alta dell'unità, Localmente calcari-arenitici, bruni, bituminosi e dolomie evaporitiche e sovrtti alternate a pelti nere, Limite inferiore graduale rapido su SCL Spessore: 0-50 m. *LADINICO SUP. (LONGOBARDICO)*

**FORMAZIONE DI BUCHENSTEIN (Formazione di Johnsiflenge Auct.)**

Unità eterolitica in due fasce eteropiche a SCL: il monosporio: dolomie grigiscure alternate a calcari dolomitici scuri, sottili orizzonti di cinerili alterate, calcari selciosi laminati, pelliti e argilliti grige, calcari a dolomie rimaste, livelli di pietre verde, Corpi metrici e lenticolari di brecce a clasti dolomitici sono intercalate ai sedimenti bacinali,Limite inferiore su CTR, bruscamente eteropico con SGL Spessore: 0-80 m. *ANISICO SUP. P.P. - LADINICO INF.*

**FORMAZIONE DELLO SCILIAR**

Dolomie perlitiodi di colore da grigio chiaro a bianco, organizzate in strati potenti fino al metro sui il sovrapposono sottili livelli intercalati di dolomiomiti grigio-verdastre, Si riconoscono gasteropodi, ammoniti, lamellibranchi ed alghe Dasycladacee, Verso Est-dominano facies interessate totalmente da dolomitizz.,

**Litofacies di scarpata (SCL)** è caratterizzata da banconi massicce, arrallgiante e mal stratificate di dolomie bianche biancastri, spesso messe con frammenti di bivalvi, gasteropodi, alghe, ammoniti, Localmente si osservano corpi di megabrecce, Limite inferiore graduale su CTR, Limite laterale eteropico con SHL, Spessore: 300÷400 m. *ANISICO SUP. – LADINICO INF.*

**FORMAZIONE DI MOENA**

Dolomie microlinee grigio scuro-nere laminate e dolomie nodulari grigio scuro alternate a sottili intercalati dolomo-argillosi a livelli centimetrici di argilliti nere (amanti da alternanze di cinerili), Limite inferiore netto su CTR e lateralmente eteropico con CTR, Spessore:0-50 m. *ANISICO SUP. (ILLIRICO)*

**FORMAZIONE DEL CONTRIN**

Dolomie subtidali chiare ad alghe calcaree, organizzate in strati potenti fino al metro e sui si sovrappongono sottili livelli intertidali di dolomiomiti grigio-verdastre, Si riconoscono gasteropodi, ammoniti, lamellibranchi ed alghe Dasycladacee, Verso Est dominano facies interessate totali a stromatoli.,

**Litofacies di scarpata (SCL)** è caratterizzata da banconi massicce, arrallgiante e mal stratificate di dolomie bianche biancastri, spesso messe con frammenti di bivalvi, gasteropodi, alghe, ammoniti, Localmente si osservano corpi di megabrecce, Limite inferiore graduale su CTR, Limite laterale eteropico con SHL, Spessore: 300÷400 m. *ANISICO SUP. – LADINICO INF.*

**FORMAZIONE DI GRIVO**

Successione litologicamente eterogenee che comprende sia carbonati che depositi clastici a granulometria variabile, Il* subtstrato in cui mentori, due dei quali presenti nel Foglio e associati per eulgrare gradino, In basso, siltiti e marne rosse a grigio scure ricche di frustoli vegetali seguite da una alternanza di siltiti grigio-giallastri bioturbati e noduli e sempre più diffusi (membro di Contesini), In alto, dolomie e calcari/dolo bioturbati, da grigio scuri a grigio nocciola, dolomie subtidali grige, intervisti siltosi grigio-giallastri e sottili orizzonti arrestitici (membro di Cunevo), A tetto è sempre riconoscibile un intervallo di 5÷10 m mal stratificato che presenta localmente ferti conglomeratiche a dasti dolomitici subangolosi o tondre di calciditi laminate emrosate (Membro del Monte Croce), Limite inferiore paraconcordante su VTS, Spessore: 80÷80 m. *ANISICO MEDIO - SUP. P.P. (PESONICO - ILLIRICO)*

**CONGLOMERATO DEVOLTAGO**

Conglomerati eterolrogossolani costituiti da clasti in prevalenza dolomitici, arrotondati (dimensioni di 1,5÷15 cm), in matrice sarenaso-siltosa bianco rosea, serrata medio-fine grallolrossa, altri micrasse rosse laminate, Limite inferiore erosivo su SLI, Spessore: 15-40 m. *ANISICO MEDIO (PESONICO P.P.)*

**DOLOMIA DEL SERLA INFERIORE**

Dolomie grigiastre con intervalli stromatolitici, oncoidi a tazze e livelli di argille rosso-verdastre, Limite inferiore netto concordante su WF$_{3a}$, Spessore: 25-60 m. *ANISICO INF.*

**FORMAZIONE DE WERFEN**

La Formazione è costituita da una complessa successione di sedimenti carbonatici, terrigeni e misti vercitori, E' suddivisa in unità di rango inferiore, La spessore è di 300 m. *PERMIANO SUP. P.P. – TRIASSICO INF.*

**Membri ed Unità Basìla, Cencenighe e San Lucano**

**Membro di San Lucano** (WF4a): alternanza di intervalli calciruditici-calcarenitici, pelliti e arenaee fini grallolrossastre, alla base, Orizzonti eteropitici grallolrossastra con noduli e lenti di gesso biancastro, siltiti rosse e siltiti arenacee rosse, caratterizzano la porzione sommitale, Limite inferiore graduale rapido su WF3, Spessore: 10-25 m.

**Membro di Cencenighe** (WF3$_a$): dolomie arenacee e dolomie calcirudditiche rossastre, in tronchi spesso nodulari, di 10÷200 cm, sui si alternano n subordine siltiti arenacee rosse, Limite inferiore transizionale rapido su WF2, Spessore: 15-40 m.

**Membro di Val Badìa** (WF2$_a$): alternanza di calcari silicei grigio-giallastri bioturbati con intercalazioni diffusamentone, sottilmente laminati, dolomie grigie a rosse, siltiti e dolomiti verdastre, Limite inferiore transizionale rapido su WF3, Spessore: 40-55 m.

**Membri dell'Ovatta e Gastropodi e Campil**

**Membro di Campil** (WF1$_a$): arenarie fini e siltiti rosse micacee in strati centimetrici con caratteristiche strutture da carico, Limite inferiore transizionale su WF2$_a$, Spessore: 30-40 m.

**Membro dell'Oddìa a Gastropodi**: calcari silicei, siltiti calcaree, calcari arenacei che passano verso tetto a calcareniti calciruditiche contenenti gusci i bivalvi/arenarie e microgasteropodi,La sedimentazione passa dal gradino alla base al rosso alla sommità,Limite inferiore transizionale rapido su WF2$_a$, Spessore: 10-25m,

**Membri di Andràz e Siusi**

**Membro di Siusi**: alternanza di calcari marnosi e marnosovulcaniti grallastri, talvolta bioturbati, siltiti grigio giallastre e violacee e calcari calciruditiodolarenitici da grigio-verdastri a rossastri, Orizzonti fossiliferi a Claraia, La porzione sommitale è rappresentata da un orizzonte eteropitico potente 10-20 m (dolomiti grallo-rossastre e siltiti verdastre), Limite inferiore netto su WF2$_a$, rappresentato da un banconi di 1,5÷2 m di calcareniti ocraceo-biodetritiche rossastre, Spessore: 40-65 m.

**Membro di Andràz**: dolomie eteropitiche, dolomiti grallo-rossastre vacuolari e siltiti verdastri, Limite inferiore graduale rapido su WF2$_a$, Spessore: 10-15 m.

## Triassico medio

## Triassico sup.

## Triassico inf.

## Permiano

**Membri di Tesero e Mazzin**

**Membro di Mazzin**: calcari e calcari dolomitici marnoso-siltosi grigio-giallastri e marne in lamine centimetriche, Limite inferiore graduale rapido su WF$_{3a}$, Spessore: 20-35 m.,

**Membro di Tesero**: dolomie calcaree rosse e grigie, dolomie calcaree grigie scuri in strati prevalentemente nodulari alternati ad arenarie a siltiti grige e marne con orizzonti carbonieri, organizzate sia in sottili intervisti sia in pacchi di strati decimetrici, Limite inferiore conforme graduale su VAL, Spessore: 0÷30 m. *PERMIANO SUP. P.P.*

**ARENARIE DI VAL GARDENA**

Arenarie rosse, grigie e bianche in banchi di spessore variabile da pochi decimetri a qualche metro, alternate a siltiti rosse o grige, siltiti marnose e marne, Nei livelli arenacei è frequente la presenza di frustoli carbonizzati e resti vegetali, Limite inferiore erosivo su ORA, LAN e BX1, Spessore: 30-70 m. *PERMIANO SUP. P.P.*

**MAGMATISMO PERMIANO**

**GRUPPO VULCANICO ATESINO**

**FORMAZIONE DI ORA**

Lapilli-tufi ridtici sabbiti, di colore variabile dal grigi-rosso all'arancio, con netta e regolare tessiturione suiventicata, Osservo costituita da elementi vulcanici (1÷5 mm) di sanidino, plagioclasi, quarzo e biotite in una pasta di fondo litoidea fluidale (grimintro), Frequenti indizi juvenili portrico, Limite inferiore netto concordante o parzialmente su BX1 e LAN, Spessore: fino a 1000 m. *PERMIANO SUP. P.P.*

**Membro di Predonzo**

Lapilli-tufi e tuff ridtici rossi caratterizzati da cristalli più piccoli e resti non abbondanti femme ed indizi juvenili rossi, Alla base, discontinua presenza di livelli arenitici (ORA$_a$) grigiverdi in cui la pasta di fondo è ossidiceraea con tessiturione perfetta e struttura eutaxitica, Limite inferiore netto discordante su TDV o graduale con ORA$_a$, Spessore: fino a 250 m. *PERMIANO SUP. P.P.*

**FORMAZIONE DITRESCHIO**

Depositi sedimentari subordinatodo ben stratificati in sudi distintigono due litofacies,

**Facies vulcaniclastica** (TVL): conglomerati e arenarie di clasti e/o matrice con elementi vulcanici da centimetrici a decimetrici, a generale assetto non orizzontale (debris flow), Locali intercalazioni di eventi torrentizi, **Facies arenitica** (TVL$_a$): eventi medio grossolani in strati da medi a spessi, massive e con laminazione incrociata, **Il colore** è generalmente rosso,Composizionalmente sono presenti lapilli dasti decimetrici-centimetrici, Limite inferiore netto ed erosivo su BX1 e LAN, Spessore: fino a 100 m. *PERMIANO INF. P.P.*

**FORMAZIONE DI ANDRIANO**

Lave rioliticne comprite da rosso arancio a rosso violaceo, con evidenti bande di fluisso di spessore tra 5 e 20 cm, porfiriche(fino ad un'ottantina di %) con struttura porfirica inizialmente ipocristallina (2÷5 mm) di sanidino, plagioclasi e quarzo, A luoghi, sono presenti facies a tufacitti, Limite inferiore netto e discordante su BX, Spessore: fino a 250 m. *PERMIANO INF. P.P.*

**FORMAZIONE DI GIRES**

Lapilli-tufi ridtici sabbiti, di colore rosso scuro violaceo, ed aspetto massivo o tornerente orientato, La roccia è costituita da cristalli millimetrici di sanidino, plagioclasi rossi, quarzo e biotite in pasta di fondo litoidica fluidale (grimintro), Frequenti indizi juvenili portrici scoriacei, Basso subordinatamente (BX$_a$) in parte prevalentemente stratificate, ad assetto caotico, sono presenti, a luoghi, strato della formazione, Sono costituite da blocchi e clasti decimetrici subangolari e/o subarrotondati, immersi in matrice microgranulare, Il clast e la matrice sono eclitiche mentre costituti da frammenti della formazione originaria,Limite inferiore netto discordante su BX5, Spessore: fino a 300 m. *PERMIANO INF. P.P.*

**FORMAZIONE DI GARGAZZONE**

Lapilli-tufi ridtici sabbiti, molto omogenei e ricchenti di colore grigiorosso, La roccia è in genere relativamente compatta, Costituisce la facies subvulcanitica basine ma da regolo (1-30 cm), Osservo con numerosi cristalli (1-2 mm) di plagioclasio, quarzo, biotite e pirosseno in una massa di fondo felsitica fluidale (grimintro), Presenza di femme e frequenti indizi juvenili portrici, Limite inferiore non esposto, Spessore almeno 150-200 m. *PERMIANO INF. P.P.*

## FACIES DEI DEPOSITI QUATERNARI

| | | | |
|---|---|---|---|
| a | Deposito di versante | T | Travertino |
| a$_2$ | Deposito di versante a blocchi prevalenti | TB | TB indifferenziato |
| a$_1$ | Deposito di frana | TB d | TB di adizione |
| a$_1$ | Deposito di frana antica | TB a | TB di alloggiamento |
| a$_1$ | Deposito di frana a grossi blocchi | b | Deposito di contatto glaciale |
| a$_1$ | Deposito di frana a grossi blocchi antica | g | Deposito glacio - lacustre |
| a$_1$ | Deposito di frana | h | Paludi attuali |
| a$_2$ | Deposito alluvionale e fluvioglaciale (ghiaia) | a/A | Deposito lacustre, palustre (argilla e limo) |
| a$_2$ | Deposito alluvionale e fluvioglaciale (sabbia) | Al | Deposito palustre (limo) |
| a$_2$ | Deposito alluvionale e fluvioglaciale (limo) | ALT | Deposito palustre (limo e torba) |
| a$_2$ | Deposito alluvionale e fluvioglaciale (ghiaia e sabbia) | aAL | Deposito palustre (sabbia e limo) |
| a$_2$ | Deposito alluvionale e fluvioglaciale (sabbia e limo) | aALT | Deposito palustre (sabbia e torba) |
| a$_3$ | Deposito di debris-flow | ALT | Deposito palustre (torba) |
| a$_3$ | Deposito di origine mista: di debris-flow e/o torrentizio e/o valanga | | Deposito antropico |
| a$_4$ | Deposito alluvionale | | Discarica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Stratificazione | | Orlo di scarpata di frana |
| | Clinostratificazione | | Orlo di scarpata di cava |
| | Stratificazione ondulata | | Traccia di alveo fluviale abbandonato |
| | Contatto stratigrafico certo e incerto | | Bordo di alveo fluviale abbandonato |
| | Faglia certa, incerta o sepolta | | Cordone morenico frontale o laterale |
| | Faglia inversa certa, incerta o sepolta | | Zona crioclastica |
| | Faglia transpressiva sinistra certa, incerta o sepolta | | Area di spostamento in blocco |
| | Faglia transpressiva destra certa, incerta o sepolta | | Conoide alluvionale |
| | Faglia trascorrente con senso non determinabile certa, incerta o sepolta | | Conoide di origine mista e di debris-flow |
| | Faglia trascorrente sinistra certa, incerta o sepolta | | Cono detritico |
| | Faglia trascorrente destra certa, incerta o sepolta | | Dolina |
| | Sovrascorrimento principale certo, incerto o sepolto | | Orlo di terrazzo |
| | Sovrascorrimento di importanza minore certo, incerto o sepolto | | Scarpata antropica |
| | Faglia sindimentarie certa, incerta o sepolta | | Sorgente |
| | Contatto con area non rilevata | | Traccia di sezione geologica |
| | Traccia di superficie assiale di sinclinale certa, incerta o sepolta | | Discarica |
| | Traccia di superficie assiale di sinclinale certa, incerta o sepolta | | Cava attiva e inattiva |
| | Traccia di superficie assiale di sinclinale certa, incerta o sepolta inclinata | | Cava attiva e discarica |
| | Orlo di terrazzo | | Cava riempita |
| | Scarpata antropica | | Pozzo per ricerca di idrocarburi |
| | Tirrosa di deformazione gravitativa profonda di versante | | Sorgente |
| | | | Traccia di sezione geologica |


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Geologico

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ufficio Geologia e prove materiali
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Amt für Geologie und Baustoffprüfung

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
Organo Cartografico dello Stato (Legge 68 del 2.2.1960)

# CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Alla Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000

# MEZZOLOMBARDO
# FOGLIO 043

della Carta 1:50.000 dell'I.G.M.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: S. Conca*, V. Maiz*
COORDINATORI SCIENTIFICI: N. Pisetti*,
DIRETTORI DEL RILEVAMENTO: M. Avanzini* (Substrato sedimentario pre-Quaternario)
G.M. Bargossi* (Substrato vulcanico),
A. Bonadio*, e M. Carton* (Copertura quaternaria)

ESPERTO: L. Selli * (Geologia strutturale)

1 = Provincia Autonoma di Trento, Servizio Geologico
2 = Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Geologia e prove materiali
3 = Dipartimento di Scienze della Terra e Geologia-ambientali, Università di Bologna
4 = Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento
5 = Libero Professionista

SUDDIVISIONE DEL RILEVAMENTO: ALLA SCALA 1:10.000
RILEVATORI: C. Ambrosi (4), M. Cassinis (3), C. Mondelli* (2), M. Ricchetti* (4),
M. Sammartinello* (4), R. Tomasoni* (2), E. Casolari* (2), G. Zambotti* (4),
F. Ferrari* (5), M. Nicolussi* (2), R. Nicolussi* (2), D. Nannoni* (2), M. Rossi* (2).

* = Libero professionista
1 = Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento
2 = SIGA Consulting s.r.l., Torino

## INQUADRAMENTO TETTONICO REGIONALE

scala 1:400.000




**LEGENDA**

- Quaternario
- Plutoniti tardoerciniche
- Coperture sedimentarie permo + mesozoiche
- Coperture sedimentarie terziarie
- Vulcaniti permiane
- Basamento metamorfico Subalpino
- Basamento metamorfico Austroalpino, Ortogneiss hofinterlandi (A).
- Faglia
- Sovrascorrimento principale

## SCHEMA TETTONICO

scala 1:200.000




**LEGENDA**

- Successioni sedimentarie: Quaternario
- Successioni permiani
- Successioni mesozoiche
- Successioni terziarie
- Faglia
- Faglia trascorrente destra
- Faglia trascorrente sinistra
- Faglia trascorrente con movimento non determinato
- Sovrascorrimento principale
- Sovrascorrimento secondario
- Traccia di superficie assiale di sinclinale
- Traccia di superficie assiale di anticlinale
- Faglia transpressiva destra
- Faglia transpressiva sinistra
- Sovrascorrimento principale

## SCHEMA DEI RAPPORTI STRATIGRAFICI




## SC