



XIX CONGRESSO NAZIONALE

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA TORACICA

28

29

30

LECCE, SETTEMBRE 2017

29

settembre

VENERDÌ

148

LO PNEUMOTORACE CATAMENIALE: NOSTRA ESPERIENZA MONOCENTRICA E REVISIONE DELLA LETTERATURA

Alessio Vincenzo Mariolo, Matteo Montoli, Francesco Damarco, Margherita Cattaneo, Davide Tosi, Alessandro Palleschi, Mario Nosotti, Luigi Santambrogio

*U.O. Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone
Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Milano*

■ Scopo del lavoro

Lo pneumotorace catameniale rappresenta una rara forma di pneumotorace spontaneo ricorrente che colpisce giovani donne in età fertile. La sua eziologia è associata alla presenza di endometriosi toracica, ma la variabilità del decorso clinico, la difficoltà di riscontro istologico e la possibile assenza di lesioni diaframmatiche evidenti, spesso impediscono una diagnosi di certezza. Questo può rendendo il successivo iter terapeutico soltanto empirico con alti tassi di recidive post-chirurgiche. Scopo di questo lavoro è descrivere l'indicazione chirurgica ed il successivo follow-up terapeutico eseguiti in caso di pneumotorace catameniale nella nostra esperienza monocentrica. I dati sono stati confrontati con quelli riportati in letteratura.

■ Materiali e metodi

L'analisi retrospettiva della nostra casistica è stata condotta includendo giovani pazienti donne sottoposte a toracosopia diagnostica ed eventuale pleurodesi per pneumotorace spontaneo recidivante tra il 01/01/2010 ed il 31/12/2016. Sono stati identificati 10 casi di pneumotorace catameniale. Di ogni paziente sono stati raccolti: l'anamnesi, l'eventuale terapia ormonale, i reperti intraoperatori di eventuali lesioni pleuriche o diaframmatiche sospette, i giorni di degenza post-operatoria, l'eventuale comparsa di complicanze post-chirurgiche e di recidive. È stata eseguita una revisione della letteratura più recente ed i dati messi a confronto.

■ Risultati

Nove pazienti sono state sottoposte ad intervento di toracosopia diagnostica e pleurodesi chimica (talco) a causa del rilievo di lesioni diaframmatiche o pleuriche (6 casi), per i plurimi episodi di pneumotorace recidivante o perché già trattate con sola pleurodesi meccanica presso altri Centri; una paziente è stata sottoposta a sola pleurodesi meccanica in toracosopia. In caso di soluzioni di continuo del diaframma sono state eseguite raffe o plicature. Abbiamo rilevato tre casi di recidiva a distanza (una sottoposta a sola successiva pleurodesi meccanica): le pazienti sono state sottoposte ad ulteriore chirurgia e non hanno più recidivato. In un solo caso si sono verificate complicanze postoperatorie (perdite aeree prolungate). I nostri dati risultano sovrapponibili e coerenti con quelli riportati nella letteratura più recente. In particolare abbiamo osservato un sovrapponibile tasso di recidive post chirurgiche nelle pazienti trattate con pleurodesi chimica con talco.

con il patrocinio di



Comune di Lecce



ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA POPOLAZIONE

autorizzazione
ASL Lecce N. 738/2017



Società Italiana Chirurgia Toracica



A I P O

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PNEUMOLOGI
OSPEDALIERI



ITALIAN RESPIRATORY SOCIETY
SIP
SOCIETÀ ITALIANA DI
PNEUMOLOGIA



ABSTRACT BOOK

XIX CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA TORACICA

a cura di Gaetano DI RIENZO

LECCE2017



SOCIETÀ
ITALIANA DI
ENDOSCOPIA
TORACICA

28

29

30 settembre